

Ceterach officinarum Lam. et D.C. en Eure-et-Loir

P. Boudier (1)

Résumé :

Les inventaires des stations anciennes de Ceterach officinarum Lam. et D.C. et des stations observées depuis 1979 montrent une nette raréfaction de cette Fougère en Eure-et-Loir.

Cette espèce n'a été observée que sur des supports artificiels.

Une cartographie selon le quadrillage U.T.M. de 1 km de côté a été établie pour le département d'Eure-et-Loir.

°
° °

Ceterach officinarum Lam. et D.C. est une petite Fougère caractéristique des supports rocheux ensoleillés ; ses frondes de 5 à 15 cm, aux faces inférieures entièrement recouvertes d'écailles roussâtres, sont profondément lobées.

Ceterach officinarum Lam. et D.C. est rattaché par certains auteurs au genre Asplenium sous le nom : Asplenium ceterach L.

La cartographie réalisée à l'échelle de la France par le Pr. Dupont montre que c'est une espèce à large répartition, se raréfiant vers le Nord-Est. Comme le fait remarquer cet auteur " une telle carte demeure cependant insuffisante ; il conviendrait d'une part de distinguer substrats naturels et substrats artificiels (ceux-ci prédominant nettement dans toute la partie nord de l'aire), d'autre part, mais c'est difficile, d'introduire un signe de fréquence".

Stations signalées au XIXe et début du XXe siècle en Eure-et-Loir :

- Dreux : Château de Dreux : Lefèvre (1866) à rechercher


CP 3.79.53.99

- Bonneval : Pilier de l'Eglise : Lefèvre (1866), Coudray (1867),

Herbier de la Société Dunoise d'Archéologie Legs Coudray

(1867) non revu (P. Delahaye - P. Boudier) CP 3.80 53.37

(1) Museum de Chartres, 12, rue St-Michel 28000 Chartres



- indications antérieures à 1960
- indications depuis 1960

Répartition de Ceterach officinarum Lam. et DC. en France (maille de 20 km.)
(D'après Dupont 1979)



Ceterach officinarum Lam. et DC.

Vieux pont sur le Loir : Lefèvre (1866), Coudray (1867),
Herbier Hanquet (1873) - non revu (P. Delahaye -
P. Boudier) CP 3.79 53.37

- Châteaudun : Cavée de la Reine : Lefèvre (1866); à rechercher
CP 3.75 53.25
- Varize : Duteyeul in Lefèvre (1866) - non revu CP 3.89 53.28
- Thiron : Lefèvre (1866) - non revu CP 3.51 53.53
- Le Gault-St-Denis : sur l'Eglise : Coudray (1867) - non revu
CP 3.87 53.44
- Nogent-le-Rotrou : Mur près du Château St-Jean : Lefèvre (1866)
et Herbier Moulin (1915) - non revu
(J. Rebiffé - P. Delahaye) CP 3.38 53.53

Localités observées depuis 1979 (2)


- Senonches : Parapet du pont de la D.140 enjambant la voie de
chemin de fer (P. Boudier) (1975) CP 3.54.53.75
- St-Maur-sur-le-Loir : Parapet du pont du Loir à Mémillon
(P. Boudier) (1975) CP 3.81 53.53
- Nottonville : Vieux mur à Pontault en direction de Vallière
(P. Boudier) (1982) CP 3.89 53.31
- Le Mée : Pierrier dans l'ancienne carrière de Villebeton
(P. Boudier) (1983) CP 3.79 53.18

Dans l'Orne en limite d'Eure-et-Loir (non cartographié)

- La Rouge : Parapet du pont sur l'Huisne entre Mâle et la Rouge :
(J. Rebiffé) CP 3.32 53.49

En Eure-et-Loir, nous notons, une nette raréfaction de cette
Fougère ; il y a eu perte de 50 % des populations depuis un siècle.
D'autre part, le Ceterach ne s'observe dans notre département que sur
des sites artificiels, principalement vieux murs et édifices en pierre,
sur lesquels il s'implante quand le mortier qui jointoie les blocs
devient déficient. La destruction des vieux murs et la restauration
des édifices anciens sont les causes principales de sa raréfaction.

(2) si le lecteur connaît ou découvre d'autres stations, nous lui
demandons de bien vouloir nous les faire connaître.



Cartographie dans le système U.T.M.
maille de base de 1 km de côté

- ✓ Localité ancienne à vérifier
- x Localité ancienne non revue
- Localité observée depuis 1979

Cartographie de Ceterach officinarum Lam. et DC.
en Eure-et-Loir

Parmi les stations observées récemment, deux sont remarquables :

- le site de Villebeton où la plante se développe dans un ancien pierrier, résidu d'exploitation du calcaire de Beauce. Le Ceterach a retrouvé là, une situation "naturelle".

- la station de Senonches qui est relativement récente : la voie de chemin de fer La Loupe - Verneuil par Senonches fut inaugurée le 11 novembre 1889 ce qui date approximativement la création de ce nouveau site.

°
° °

Le Ceterach est donc une Fougère qui reste rare en Eure-et-Loir plus, d'ailleurs, par l'absence de supports favorables que pour des raisons climatiques. Sa présence est directement liée au matériau de construction utilisé par l'homme. L'emploi récent du béton ne permettra sans doute pas une expansion de cette espèce qui restera cantonnée dans les secteurs de vieilles constructions en pierre.

Bibliographie

- LEFEVRE Ed. 1866 Statistique scientifique d'Eure-et-Loir : Botanique
Soc. Arch. d'Eure-et-Loir 308 p.
- COUDRAY L.D. 1867 Essai sur la Flore dunoise : Bull. Soc. Dunoise d'Arch.
2 : 79 - 98
- DUPONT P. 1979 Introduction à la Cartographie Floristique de la
France : Présentation de 42 cartes expérimentales ;
perspectives. Bull. Soc. Bot. de France Lettres Bot.
126 (5) : 543 - 577
- FARCY J.C. La Route et le Rail en Eure-et-Loir au XIX^e s.
CDDP Chartres
- Herbier de la Société Dunoise d'Archéologie (en dépôt au Museum de
Chartres)
- Herbier Hanquet (Propriété de la Société Dunoise d'Archéologie, en
dépôt au Museum de Chartres)
- Herbier Moulin (Privé).