

## SYNTHESE DES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES EN EURE -ET- LOIR ( PERIODE DU 10-01-1987 AU 31-10-1987 )

M. DOUBLET

DESSINS DE F. DUPLANT



Cette synthèse fait suite à celle publiée pour l'année 1986. Nous avons décidé d'arrêter la période d'observations au 31 octobre ceci paraissant plus logique car, à cette date, les espèces migratrices ayant niché nous ont presque toutes quitté et les hivernants, pour la plupart, ne sont pas encore installés. Les zones prospectées sont les mêmes qu'en 1986 à quelques variantes près.

Les espèces communes sont mentionnées sans commentaires sauf information intéressante et sauf pour les migrateurs (dates d'arrivée et de départ).

Les recensements d'"Oiseaux d'eau" sont effectués chaque année à 3 reprises (mi-janvier, mi-mars et mi-octobre) par les ornithologues de la SAMNEL. A ces périodes les vallées et les plans d'eau sont visités par les participants qui effectuent un comptage des oiseaux d'eau.

Nous remercions vivement les observateurs dont les noms suivent pour leur participation à cette synthèse.

ADELMARD G. ; BOUDIER P. ; BOUGNOL O. ;  
CATHERINOT Y. ; CENSE T. ; CHANTARD F. ;  
CRON C. ; DUPLANT F. ; ESNAULT D. ;  
GILSON T. ; GUERRIER F. ; GUERRIER H. ;  
HOUSSEIER A. ; HOUSSEIER L. ; LÉBOULLANGER G. ;  
LEBRAS E. ; LEMÉE E. ; LETOUMELIN P. ;  
MAURETTE J. ; MOREAU G. ; PEDROT B. ;  
REBIFFE J. ; ROYER D. ; RUFFLET J-C. ;  
THIREAU B. ; VAN DROMME D.

(1) 47, rue de la Mairie Berchères-les-Pierres 28630 Chartres

(2) 7, rue Henri-Dunant 28200 Chateaudun

Soc. Amis Mus. Chartres Nat. Eure-et-Loir :  
Bull., 1989, 0 : 25 - 48.

### SYNTHESE METEOROLOGIQUE (\*) ( voir tableaux 1, 2 et 3 )

A noter un premier trimestre très froid et en particulier le mois de janvier le plus froid (avec 1963) depuis que la station météo de Chartres possède des mesures fiables (1946), avec une 2ème décade exceptionnellement froide (moyenne des minimales - 10°1, moyenne des maximales - 0°2). Dix huit journées sans dégel et 11 jours avec précipitations neigeuses pour ce mois.

A relever encore, un mois d'avril exceptionnellement chaud, très ensoleillé et par contre le mois de mai le plus froid depuis que la station de Chartres est ouverte (1946). Ensuite le mois de juin sera froid et exceptionnellement arrosé avec un ensoleillement minimal record pour la station de Chartres depuis que des mesures d'insolation sont effectuées (1961).

Mois de juillet très pluvieux (depuis le début des mesures en 1946, seul juillet 1955 a été plus arrosé) et peu ensoleillé et octobre exceptionnellement pluvieux et peu ensoleillé.

#### Vents

Janvier : secteurs ouest-nord-ouest en début de mois puis secteurs nord-est ensuite, faibles à modérés.

(\*) d'après les données de la Météorologie Nationale, Centre départemental de la Météorologie - Chartres.





Tableau 2 : Précipitations (station de Chartres)






Tableau 3 : Insolation (station de Chartres)



Trait pointillé : moyenne 1946 - 1986

Trait plein : 1987

Tableau 1 : Températures (station de Chartres)

Février : variables faibles à modérés durant la 1ère quinzaine puis nord et enfin sud-ouest les 4 derniers jours.

Mars : secteurs ouest-sud-ouest à nord-ouest, généralement modérés avec une pointe de 83 km/h le 27 (vent d'ouest-sud-ouest).

Avril : ouest-sud-ouest en début de mois, généralement modérés à assez forts, plus faibles et variables ensuite.

Mai : secteurs dominants d'ouest à nord avec un chiffre important de vents forts : 7 (supérieurs à 58 km/h).

Juin : secteurs sud-ouest à ouest généralement faibles à modérés avec une pointe de 72 km/h le 7 (nord-ouest).

Juillet : est-nord-est du 1er au 5, variables jusqu'au 13 puis sud-ouest à nord-ouest et nord à partir du 23.

Août : secteurs ouest à nord-ouest généralement faibles.

Septembre : très variables et généralement faibles avec une pointe de 76 km/h le 24 (nord-ouest).

Octobre : secteur ouest à sud-ouest généralement modérés et, pendant 7 jours, forts avec notamment, dans la nuit du 15 au 16, une pointe de 97 km/h par vent d'ouest.

\* \* \*

\* \* \*

\* \* \*

## LISTE SYSTEMATIQUE DES ESPECES

### Grèbe huppé *Podiceps cristatus*

Au cours de la 1ère décade de janvier, des Grèbes stationnent encore sur certains étangs (Ecluzelles, Jouy, St-Piat, Benette). La 2ème décade du mois, très froide, entraîne le gel de tous les plans d'eau et les Grèbes huppés disparaissent jusqu'au 10 février (à l'exception d'un individu stationnant sur un petit étang alimenté par des sources et non gelé à Fontenay-sur-Eure). Le comptage de la mi-mars a concerné 184 ind. soit nettement plus qu'en 1986 (110 ind.).

A Ecluzelles, 11 à 12 couples ont niché (contre 15-16 l'an passé) et, à Fontenay-sur-Eure, un couple a élevé 2 nichées de 3 jeunes chacune (éclosions fin avril et mi-août). A mi-octobre, 102 Grèbes huppés ont été dénombrés lors d'un comptage.

### Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

Comme les années précédentes, cette espèce a été observée uniquement sur les étangs de Perruchet et Thellière. Première mention le 18 avril (2 ind.), maximum le 21 avril (7 ind.) et dernière observation le 12 juin (2 ind.).

### Grèbe castagneux *Tachybaptus ruficollis*

Peu fréquent pendant la période de gel des plans d'eau, ce Grèbe a ensuite été noté en petit nombre sur les étangs. En période de reproduction, la vallée de la Conie, avec un niveau d'eau très bas (et un assèchement sur une partie de son cours) cette année encore, n'a

pas permis d'obtenir de bons résultats pour la nidification. A noter à l'automne : 42 ind. sur les étangs du Perruchet et Thellière, le 26 septembre.

### Grand cormoran *Phalacrocorax carbo*


En début d'année pas de mention avant le 13 mars (2 ind. à Ecluzelles). A la fin de ce mois 3 ind. étaient présents au Perruchet (le 29). Le 4 avril, une bande de 40 ind. était notée à St Georges-sur-Eure, en vol en direction du nord. Deux autres mentions pour avril : 1 ind. à Fontenay-sur-Eure le 15 et un autre au Perruchet le 18. A l'automne, 3 ind. étaient observés le 23 septembre à St Georges-sur-Eure puis, en octobre, 1 ind. était mentionné à Villiers-le-Morhier le 17. Le même jour un autre stationnait à Landelles et un dernier à Ecluzelles.

### Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*


Un Cormoran huppé était noté le 17 octobre à Ecluzelles en compagnie d'un Grand cormoran (A. HOUSIER). Oiseau marin, le Cormoran huppé est très rare à l'intérieur des terres mais il avait déjà été observé à Ecluzelles en 1985 en novembre et décembre.

### Héron cendré *Ardea cinerea*

Bonne réussite de la colonie d'Argenvilliers où au moins 16 couples ont élevé des jeunes, les derniers quittant la colonie fin juillet. Pas de rassemblement important en période post-nuptiale (maximum 17 ind. à



GRÈBE HUPPÉ



CANARD PILET

Alluyes le 28 août). Au comptage de la mi-octobre, 48 hérons ont été dénombrés.

Héron bihoreau *Nycticorax nycticorax*

A Ecluzelles, un adulte et un immature étaient présents jusqu'au 10 janvier, pas de mentions ensuite pendant la vague de froid. Le Bihoreau sera ensuite signalé le 1er mars (2 adultes). Parades et rechargement des nids seront constatés le 29 mars (11 ou 12 oiseaux présents). Le 20 avril, 6 nids sont couvés et 2 autres fréquentés. Au total, 18 adultes et 1 immature fréquentent le site ce jour-là. Le 24 mai, 7 jeunes sont observés perchés près des nids (O. BOUGNOL). La végétation n'a pas permis de noter le nombre total de jeunes élevés. A la mi-octobre, 7 ind. étaient recensés à Ecluzelles. A Fontenay-sur-Eure, un adulte était noté le 16 juin mais aucune autre observation ne sera effectuée par la suite en ce lieu.

Blongios nain *Ixobrychus minutus*

Un mâle a été observé le 16 mai dans la vallée de la Conie à Péronville (*Bull. Nat. Orléanais* 1987). Cette espèce, non contactée en période de nidification cette année encore dans cette vallée, doit y stationner, peu fréquemment, au moment des migrations.

Cigogne blanche *Ciconia ciconia*

A Arrou le 9 mai, une Cigogne blanche fréquentait l'Yerre avant de s'éloigner en direction de la Chapelle-Royale (D. VAN DROMME). Le 1er septembre, une Cigogne épuisée était recueillie au bord d'une mare à Frétigny par (G. LEBOULLANGER, qui l'a soignée avant de la remettre au centre de Jouy-en-Josas). Une autre Cigogne a été observée à l'automne par plusieurs habitants de Bonville. La Cigogne blanche est à l'heure actuelle rarement observée en Eure-et-Loir. Précédente mention : 1 ind. observé à Blévy le 28-9-86 par G. JARDIN (BOUVIER et HADANCOURT 1988)

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

A la mi-mars, 24 Cygnes étaient dénombrés. Cette espèce a niché à Méréglise (6 jeunes), Argenvilliers (3 j.), Alluyes (6 j.) Saumeray (4 j.) et Orgères où un couple a obtenu 8 jeunes dont 2 seulement ont survécu. Ce dernier couple est particulièrement prolifique puisqu'il avait élevé 8 jeunes en 1985 et 7 jeunes en 1986 (G. ADELMARD). Au comptage de la mi-octobre, 32 Cygnes étaient dénombrés.

Oie cendrée *Anser anser* et  
Oie sp. *Anser sp.*

Premier vol migratoire signalé à Mainvilliers le 2 février (20 ind.). Quatre autres observations seulement concernant ce mois. Le passage est net en mars (17 observations) maximum : 220 ind. en 3 bandes le 3 mars à Champrond-en-Gâtine. Dernière mention lors du passage pré-nuptial, (2 ind.) à St-Luperc le 3 avril.

A l'automne, 2 vols d'Oies sp. étaient vus au-dessus de Chartres le 15 septembre (61 ind.) et le lendemain (12 ind.) en vol vers le sud. En octobre, une troupe de 80 Oies cendrées a stationné à St-Georges-sur-Eure du 18 au 25 ; pour ce mois, observations également à Goindreville et Bailleau-l'Evêque.

Oie à tête barrée *Anser indicus*

Pour l'anecdote, nous signalerons l'observation d'un individu de cette espèce à Ecluzelles les 15 et 22 mars (O. BOUGNOL). Cet oiseau était certainement échappé de captivité. L'espèce niche en Asie centrale depuis le Pamir et le Tian Shan jusqu'au Laddak, Altaï, Mongolie et hiverne en Inde, en Assam et au nord de la Birmanie (ETCHECOPAR et HUE 1978).

Tadorne de Belon *Tadorna tadorna*

Toutes les observations du 1er trimestre concernaient un seul individu soit : Alluyes le 11 janvier, St-Georges-sur-Eure les 14 et 24 février, St Piat le 5 mars, Maintenon le 15 mars, Vert-en-Drouais

le 16 mars et Jouy le 18 mars. A Alluyes, un couple a stationné quelques jours, à partir du 3 avril (il s'agit, peut-être, du couple qui avait niché en 1985 et avait fréquenté assidûment le site sans pouvoir nicher en 1986). Une seule mention à l'automne (1 ind. à Ecluzelles le 17 octobre ).

#### Canard colvert *Anas platyrhynchos*

A Cloyes-Montigny-le-Gannelon, 257 ind. étaient recensés à la mi-janvier ( *Bull. Perche-Nature* 1987) alors que les plans d'eau gelés ailleurs ne permettaient pas d'observation notable. Par contre, le 23 janvier, 650 ind. stationnaient à Ecluzelles. Le 22 septembre, 150 Colverts étaient vus à St Georges-sur-Eure puis à la mi-octobre, 897 ind. seront dénombrés dans le département.

#### Canard chipeau *Anas strepera*

Peu d'observations comme d'habitude pour ce canard : un mâle et une femelle à Fontenay-sur-Eure le 14 février, un autre couple à Ecluzelles le 15 mars et toujours un mâle et une femelle à l'étang de Thellière les 15 et 22 mars.

#### Canard siffleur *Anas penelope*

Pas de mention avant le 28 février (un mâle à Saumeray). Au recensement de la mi-mars 21 ind. étaient dénombrés ; 2 autres observations clôtureront cette période : 5 ind. au Perruchet le 22 mars et 4 ind. à Fontenay-sur-Eure le 26 mars. Une seule mention à l'automne : 1 femelle à Orgères le 31 octobre.

#### Sarcelle d'hiver *Anas crecca*

En janvier, en dehors d'Ecluzelles, où quelques individus ont été vus à plusieurs reprises, 18 ind. stationnaient à la Benette le 10. Aucune mention ensuite avant la mi-février ; jusqu'à la mi-mars les observations n'ont concerné que quelques oiseaux. Au comptage de la mi-mars, 107 Sarcelles d'hiver étaient dénombrées (maximum 20 ind. à Alluyes), une semaine plus tard des bandes seront encore notées ; 22 ind. à St-Avit-les-Guespières et 20 ind. à Méréglise le 21 mars. Dernière mention pour le passage pré-nuptial : 9 ind. à Fontenay-sur-Eure le 9 avril. Une observation en période de nidification :

un mâle posé sur l'Eure et alarmant, à St-Maurice-St-Germain, le 8 juin. Observations en petit nombre (maximum 6 ind.) en septembre et octobre.

#### Sarcelle d'été *Anas querquedula*

Une seule observation pour toute la période ! Un couple stationnait sur un étang de Fontenay-sur-Eure le 7 avril. Les sites où l'espèce s'était reproduite les années précédentes ne sont plus favorables à la nidification ("aménagement" des plans d'eau à Saumeray et St-Georges-sur-Eure et assèchement d'une partie de la Conie).

#### Canard pilet *Anas acuta*

Canard peu observé, comme les années précédentes : 1 ind. à la Benette le 10 janvier, 1 autre à Ecluzelles le même jour puis 5 ind. à St-Avit-les-Guespières le 15 mars, 9 autres à Méréglise le même jour et, enfin, un mâle au Perruchet le 22 mars.

#### Canard souchet *Anas clypeata*

Pas d'observation avant le 9 mars (2 mâles à St Luperce). Au recensement de la mi-mars 23 ind. seront dénombrés. Les mentions étant ensuite régulières jusqu'au 11 avril (maximum 6 ind.) une dernière observation concernant St Luperce le 23 avril (1 mâle). A l'automne, le Souchet sera noté uniquement au Perruchet à partir du 26 septembre.

#### Fuligule morillon *Aythya fuligula*

En février, observé à Fontenay-sur-Eure et au Perruchet. Huit oiseaux notés au comptage de la mi-mars. Des Morillons seront notés ensuite jusqu'au 21 avril, toujours en petit nombre (maximum 11 ind.). Un mâle stationnait au Perruchet le 12 juin. Pas d'observation en fin de période.

#### Fuligule milouin *Aythya ferina*

Présent jusqu'au 10 janvier (maximum 20 ind. au Perruchet). Pendant la période de gel le Milouin est absent sauf 1 ind. à Fontenay-sur-Eure. Retour des oiseaux à partir du 10 février : le 14 de ce mois, 68 ind. présents à Perruchet et Thellière. Au recensement de la mi-mars, 170 ind. étaient dénombrés. En dehors des sites de nidification, des Milouins seront

présents jusqu'à fin avril. Le 29 mai à Argenville une femelle était accompagnée de 15 jeunes âgés d'une semaine, il s'agissait sans doute de la descendance de 2 femelles. Pas de rassemblement en fin de période.

Garrot à oeil d'or *Bucephala clangula*

Le 25 janvier, 2 femelles sont notées à Montigny-le-Gannelon. A Saumeray, une femelle a été vue du 14 février au 25 avril se déplaçant d'un plan d'eau à l'autre. A l'étang de Thellière, 2 femelles étaient présentes, plongeant sans cesse, le 28 février. A Méréglise enfin, un mâle sera mentionné du 3 au 15 mars et, ce dernier jour, une femelle stationnait sur un étang voisin.

Harle piette *Mergus albellus*

Une seule mention : le 10 février une femelle s'envole d'un étang à Fontenay-sur-Eure.

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus*

Le 9 octobre, à Fontenay-sur-Eure, un Balbusard est observé en vol au-dessus d'un étang, poursuivi par 3 Corvidés (une Corneille, un Freux et un Choucas !) qui le harcèlent ; l'oiseau pousse quelques petits cris (M. Doublet). Ce superbe rapace est assez rarement mentionné en Eure-et-Loir, cette observation étant la 5ème pour les années 80 dans le département, à notre connaissance.

Milan royal *Milvus milvus*

Bonne série d'observations pour ce rapace (une seule mention en 86). 1 ind. au Boullay-Mivoie le 16 janvier par -7°C et avec 15 cm de neige (B. THIREAU). Le même jour, 1 ind. en vol au-dessus d'Auneau (J. MAURETTE). Puis le 5 mars, 1 ind. en vol à Mainvilliers (A. et L. HOUSIER). A l'automne, le 4 octobre à St-Georges-sur-Eure, 1 ind. en vol direction SE, puis un autre, direction S (E. LABRAS). Le 16 octobre, 1 ind. à Bazoches-en-Dunois (M. DOUBLET).

Milan noir *Milvus migrans*

Une seule observation, le 25 avril où 1 ind. plane à St-Victor-de-Buthon (M. DOUBLET).

Epervier d'Europe *Accipiter nisus*

Mentionné assez régulièrement jusqu'à mi-avril puis noté uniquement sur quelques sites du Perche en période de reproduction. Des oiseaux en migration seront signalés à partir du mois d'août.

Autour des palombes *Accipiter gentilis*

Un mâle et une femelle survolent les pelouses et le marais à Varize le 4 août (T. CENSE). L'observation de 2 oiseaux est d'autant plus remarquable que l'Autour est rarement signalé en Eure-et-Loir.

Buse variable *Buteo buteo*

En dehors du Perche, nidification certaine signalée à Jaudrais.

Bondrée apivore *Pernis apivorus*

Premières Bondrées observées les 24 et 25 avril. Un couple a niché à Conie-Molitard ; en période de reproduction, cette espèce a été aussi mentionnée à St-Victor-de-Buthon, Chapelle-Guillaume, Douy et St-Eliph. Peu notée en migration post-nuptiale, les dernières à Viabon le 12 septembre (4 ind.).

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

Pas d'observation avant le mois de mars. Pour le premier semestre, en dehors de la vallée de la Conie, 2 mentions seulement : 1 ind. à Charray le 31 mars et 1 ind. à Nogent-sur-Eure puis Bailleau-le-Pin le 27 juin. En août, l'espèce sera signalée en dehors de la vallée de la Conie (Theuville, Melleville, Baignolet et Alluyes). Trois mentions en octobre pour clore la période.

Busard St Martin *Circus cyaneus*

Pendant les 10 mois de la période, mentionné régulièrement, maximum en mars (11 observations). En période de nidification, mâles adultes ou couples notés dans 10 communes. A Melleville, une reproduction tardive était notée le 1er août avec 5 jeunes dont le dernier fraîchement éclos ; malheureusement la nichée "disparaîtra" quelques jours plus tard.





BALBUZARD PÊCHEUR



Busard cendré *Circus pygargus*

Premières mentions le 19 avril (1 mâle à Bonneval) et le 20 avril (1 femelle à Goindreville). La raréfaction dans le secteur de Beauce prospecté par O. Bougnol se confirme ; 1 seul couple nicheur cette année. A noter également un mâle à Villemeux le 12 juillet.

Faucon hobereau *Falco subbuteo*

Première mention seulement le 16 mai (2 ind. à Argenvilliers). En période de reproduction, le Hobereau sera vu à Saumeray, St-Victor-de-Buthon, Frétigny et à l'étang du Perruchet où 4 ind. chassent les Libellules les 13 et 18 juillet. Dernière observation : 1 ind. à Fontenay-sur-Eure, le 8 septembre.

Faucon émerillon *Falco columbarius*

Peut-être à cause de la vague de froid ce Faucon sera mentionné plus souvent que d'habitude en début d'année. D'abord le 3 janvier, 1 ind. poursuit un passereau qui lui échappe à Viabon puis, le 17 janvier, 1 ind. attaque une troupe de Chardonnerets à Berchères-les-Pierres (échec là aussi). Le 26 janvier, une femelle (Par femelle, il faut comprendre soit une femelle soit un immature à cause de la ressemblance) sera notée à Morancez et le 31 janvier à Thivars un autre oiseau est mentionné. 2 observations en février : tout d'abord le 19 à Alluyes où un Emerillon attaque une bande d'Alouettes des champs, puis le 28, à Vieuvicq où une femelle vole au ras des champs. A l'automne, 3 observations en octobre : d'abord, le 8, une femelle en vol à Néron, puis le 17, une femelle en vol puis posée sur une motte, à Loulappe et enfin, le 24, à la Bourdinière, une femelle posée aussi sur une motte de terre.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

Perdrix rouge *Alectoris rufa*

Perdrix grise *Perdix perdix*

Caille des blés *Coturnix coturnix*

Premiers contacts (auditifs) les 9 et 10 mai

(Berchères-les-Pierres et Plainville). Des chants seront ensuite notés régulièrement jusqu'à la fin de la 1ère décade d'août. Encore un chanteur régulier à Melleville début septembre et dernière observation, le 11 octobre à Viabon.

Faisan vénéré *Syrnaticus reevesii*

Grue cendrée *Grus grus*

Deux mentions à l'automne : une troupe de 20 ind. en vol en direction de Châteaudun le 18 septembre à 8 h 30 (Y. CATHERINOT), observation précoce. Ensuite 4 ind. vus à St-Georges-sur-Eure aux environs du 20 octobre (information recueillie par E. LEBRAS).


Outarde canepetière *Otis tetrix*

Notée uniquement à Baignolet mais population non-suivie cette saison.

Râle d'eau *Rallus aquaticus*

Observé régulièrement dans la vallée de l'Eure pendant le 1er trimestre, le Râle d'eau a niché dans la vallée de la Conie où il sera noté jusqu'à la fin de la période considérée.

Poule d'eau *Gallinula chloropus*



POULE D'EAU

Foulque macroule *Fulica atra*

De rares oiseaux étaient notés, sur les rivières pendant la période de froid. Au recensement de la mi-mars 207 ind. seront dénombrés et, à l'automne, seulement 116 ind. au recensement de mi-octobre.

Huitrier pie *Haematopus ostralegus*

Deux observations en mars, 1 ind. à Ecluzelles le 1er (O. BOUGNOL) puis 2 ind. en vol à St-Georges-sur-Eure le 13 (E. LEBRAS). Cette espèce maritime est ainsi observée en Eure-et-Loir pour la 3ème année consécutive.

Avocette *Recurvirostra avosetta*

Deux mentions : 1 ind. à Saumeray, le 2 août (O. BOUGNOL), puis 5 ind., à Moinville-la-Jeuilin en septembre (O. BOUGNOL).

Grand gravelot *Charadrius hiaticula*

Une observation en avril, (1 ind. à St-Georges-sur-Eure le 16). En mai plusieurs oiseaux (maximum 5) seront notés entre le 16 et le 30 mai à Alluyes et Saumeray. Au passage postnuptial des Grands gravelots ont stationné les 28 août, 20 septembre et 10 octobre à Alluyes (maximum 3 ind.)

Petit gravelot *Charadrius dubius*

Le premier sera noté à Saumeray le 3 avril, les mentions devenant régulières à partir de la 2ème décennie de ce mois. L'espèce a niché dans les vallées de l'Eure et du Loir (gravières). Peu d'observations en septembre, les derniers étant vus le 3 octobre à Alluyes et Saumeray.

Gravelot à collier interrompu

*Charadrius alexandrinus*

Deux observations au printemps : 1 ind. à St-Georges-sur-Eure le 13 avril (A et L. HOUSIER) puis 1 à Alluyes le 27 mai (M. DOUBLET). Ce petit limicole est peu fréquent à l'intérieur des terres ; en région parisienne (Ile de France et une partie des dé-

partements limitrophes) il a été vu 9 printemps sur 23 (période 1953-1975) essentiellement en avril et mai (NORMAND et LESAFFRE 1977). En Eure-et-Loir, à notre connaissance, la précédente mention remonte au 13-4-83 (1 ind. à Ecluzelles).

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*

Jusqu'au 7 janvier, les Pluviers dorés seront notés à plusieurs reprises (maximum 150 ind. à Cernay) puis, comme les Vanneaux, il font route vers le sud pour ne réapparaître qu'à partir du 9 février. Mentions régulières de fin février à fin mars (maximum 350 ind. à Vieuvicq le 28 février puis 200 ind. à Montlandon le 8 mars et 300 ind. à Saumeray le 21 mars). Derniers passages à St-Georges-sur-Eure le 2 avril. Deux observations en octobre, la première à Amilly le 20 (20 ind.)

Vanneau huppé *Vanellus vanellus*

Bandes fréquentes au tout début de l'année (jusqu'au 10 janvier) puis absence pendant la vague de froid, les premiers Vanneaux remontés du sud étant mentionnés le 7 février. Stationnements de bandes en général peu importantes (maximum 750 ind. à Saumeray le 28 février) jusqu'à fin mars. Le Vanneau a niché à St-Georges-sur-Eure et Germignonville et probablement à Saumeray, Thiron-Gardais et Viabon.

Bécasseau variable *Calidris alpina*

Au printemps, observé le 16 mai et le 20 juin à Alluyes et les 27 et 28 mai à St-Georges-sur-Eure ; à l'automne, mentionné le 20 septembre à Alluyes puis le 3 octobre à Alluyes et Saumeray (1 ou 2 ind. à chaque fois).

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii*

Espèce observée pour la 2ème année consécutive en Eure-et-Loir : 1 ind. à Alluyes le 16 mai (L. HOUSIER).

Bécasseau minute *Calidris minuta*

Une seule observation : 1 ind. se nourrissant

avec 2 Bécasseaux variables le 3 octobre à Saumeray.

Bécasseau maubèche *Calidris canutus*

Le 20 mai, à Alluyes, un Bécasseau maubèche se nourrit sur une vasière (M. DOUBLET). Cette espèce est assez rare à l'intérieur des terres. En région parisienne elle a été notée 5 printemps sur 23 (période 1953-1975) toujours en mai (NORMAND et LESAFFRE, 1977). Nous ne connaissons pas d'autre mention de cette espèce en Eure-et-Loir pour les années 80

Chevalier gambette *Tringa totanus*

Premier individu observé le 9 avril à Fontenay-sur-Eure puis noté régulièrement jusqu'au 28 mai (maximum 9 ind. à Alluyes les 16 et 20 mai). Une observation en juin (1 ind. d'Alluyes le 20). Aucune mention pour le passage post-nuptial.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus*

Une seule observation pour la période : 1 ind. à St-Georges-sur-Eure les 27 et 28 avril.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia*

Première mention le 13 avril (1 ind. à St-Georges-sur-Eure), observé ensuite assez régulièrement mais toujours isolément jusqu'au 28 mai. Une observation en juillet (1 ind. au Perruchet le 13), les derniers étant notés les 16 et 17 septembre à St-Georges-sur-Eure (6 ind.)

Chevalier guignette *Tringa hypoleucos*

Première mention seulement le 24 avril à Jouy, ce Chevalier sera ensuite noté régulièrement jusqu'au 28 mai (maximum 13 à Alluyes et Saumeray le 16). Une observation en juin (le 25) à Fontenay-sur-Eure puis les données reprennent à partir du 19 juillet, les 2 derniers étant vus à Villebon le 13 octobre.

Chevalier sylvain *Tringa glareola*

Une seule observation : 1 ind. se nourrit sur une vasière à Alluyes le 9 mai.

Chevalier cul-blanc *Tringa ochropus*

Première observation le 18 avril à Beaumont-les-Autels, une seule autre mention pour ce mois. Les 2 premiers migrateurs post-nuptiaux seront vus à Alluyes le 20 juin et à la fin de ce mois, 16 ind. seront dénombrés à St-Georges-sur-Eure (le 30). Mentions assez régulières en juillet et août, le dernier étant noté dès le 1er septembre à St-Georges-sur-Eure.

Chevalier combattant *Philomachus pugnax*

Première mention le 3 avril à Saumeray, cette espèce étant notée ensuite à St-Georges-sur-Eure, Jouy et Alluyes où le dernier sera vu le 20 mai (1 ou 2 ind. pour chaque observation). Pas de mention pour le passage post-nuptial.

Barge à queue noire *Limosa limosa*

Une seule observation : 1 ind. à Saumeray le 31 juillet (O. BOUGNOL)

Barge rousse *Limosa lapponica*


Le 2 mai, 2 ind. se nourrissent sur la vasière d'un étang à Beaumont-les-Autels (M. DOUBLET). Cette Barge est assez rare à l'intérieur des terres ; en région parisienne elle a été notée 6 printemps sur 23 (période 1953-1975) essentiellement en mai (NORMAND et LESAFFRE 1977). Nous ne connaissons pas d'autre mention en Eure-et-Loir pour les années 80

Bécasse des bois *Scolopax rusticola*


La croûle a été notée à Fontenay-sur-Eure du 15 au 21 mars mais il s'agissait de migrateurs (E. LEBRAS) puis en avril en forêt de Montécôt (C. CRON) où il faudrait rechercher une éventuelle nidification.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago*

Peu mentionnée en janvier et février mais régulièrement en mars (maximum 15 ind. le 15 mars à Fontenay-sur-Eure). Une seule observation en avril, le 18 à St-Georges-sur-Eure. C'est dans cette commune que



BÉCASSINE DES MARAIS



CHEVALIER GUIGNETTE

Les premières seront notées au passage post-nuptial (15 ind. le 16 septembre). Par la suite, les observations seront rares.

Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus*

Espèce non recherchée à son arrivée printanière, dernière mention dès le 25 juillet.

Mouette rieuse *Larus ridibundus*

Le dortoir d'Ecluzelles n'a pas été suivi régulièrement. En avril, 115 ind. étaient dénombrés, le 18, au Perruchet.

Mouette pygmée *Larus minutus*

Une seule mention : 3 adultes et 2 immatures au Perruchet le 18 avril (O. BOUGNOL).

Goéland sp. *Larus sp.*

Le 11 juillet une bande de 35 Goélands "argentés" (Goéland argenté *Larus argentatus* ou Goéland leucophée *Larus cachinnans*) étaient observés à Mainvilliers en vol en direction du Nord-Ouest (L. HOUSSIER).

Sterne caugek *Sterna sandvicensis*

Cette Sterne, rarement mentionnée à l'intérieur des terres, a fait l'objet d'une observation : le 12 juin, à Alluyes, 10 adultes ont été observés posés et pêchant dans une gravière, l'un d'eux portait une bague métallique à la patte droite. Au bout de 2 heures et demie de présence, la bande s'est éloignée, direction sud-est (O. BOUGNOL). Nous ne connaissons pas d'autre observation de cette Sterne dans le département.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

Les gravières d'Alluyes et Saumeray ont été fréquentées à partir du 11 avril (4 ind.). Cinq couples se sont cantonnés sur la gravière d'Alluyes fin avril, les oiseaux couvant le 10 mai alors que le radeau était installé quelques jours avant (le 7) par des membres de la SAMNEL et de l'APAN sur la gravière de Saumeray. Le 24 mai, les nids devenus accessibles à pied,

étaient découverts vides, des traces de pas signalant une fréquentation humaine (O. BOUGNOL). Déjà les Sternes se cantonnent sur de petits îlots proches du site de couvaïson déserté et vont effectuer une 2ème ponte. Le 21 juin, alors qu'au minimum 15 adultes sont présents sur le site, les premiers poussins sont observés. Nidification particulièrement réussie : 4 couples avec 3 poussins et le 5ème avec 2 poussins. Sur les 14 jeunes, 12 parviendront à l'envol. Dernière mention pour le site, le 2 août (O. BOUGNOL et M. DOUBLET). Une petite gravière de St-Georges-sur-Eure sera fréquentée (maximum 3 ind.) avec parades nuptiales le 24 mai, les oiseaux étant observés jusqu'au 26 juin sur ce site. Cette Sterne a également été mentionnée à Argenvilliers (18 avril, 1 ind.), Arrou (avril, 1 ind.), Fontenay-sur-Eure (30 juin, 1 ind. et 30 juillet, 2 ind.) et Montigny-le-Gannelon en mai puis en septembre (2 ind. le 6).

Sterne naine *Sterna albifrons*

Trois observations à Alluyes-Saumeray : 1 adulte les 7 juin et 4 juillet et 1 jeune en vol le 21 juillet (O. BOUGNOL).

Guifette noire *Chlidonias niger*

Les premières ont été notées le 18 avril à Ecluzelles (3 ind.) et au Perruchet (6 ind.) Au printemps, 6 observations en avril, 6 en mai et 1 en juin (2 ind. à Alluyes le 20). Deux mentions en septembre : 2 ind. à St-Georges-sur-Eure, les 6 et 7, et 1 ind., au Perruchet, le 26.



Guifette moustac *Chlidonias hybrida*

Seule mention pour la période, 1 ind. à Argenvilliers, le 2 mai (M. DOUBLET).

Pigeon colombin *Columba oenas*

Pigeon ramier *Columba palumbus*

Principales bandes notées de fin janvier (2000 ind. le 31 à St-Luperce) à fin mars.



GUIFETTE NOIRE

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto*

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*

Première mention le 20 avril à Fontenay-sur-Eure (5 ind.). Fin août et début septembre, observations de bandes peu importantes (maximum 41 ind. à Dammarie, le 10 septembre). Dernières observations, le 26 septembre, à Bazoches-en-Dunois et Péronville.

Coucou gris *Cuculus canorus*

Mentionné régulièrement à partir du 11 avril, pas d'observation postérieure au 26 juillet.

Chouette effraie *Tyto alba*

Hibou moyen duc *Asio otus*

Dortoir de 5 ind. jusqu'à la mi-février à Berchères-les-Pierres ; un autre dortoir de 12 ind. à Champrond-en-Gâtine, le 14 février. Un couple a niché à Eronville.

Hibou des marais *Asio flammeus*

Une seule mention : 1 ind. en vol, à Berchères-les-Pierres, le 11 octobre.

Chouette chevêche *Athene noctua*

Observée uniquement dans le Perche et dans le Drouais.

Chouette hulotte *Strix aluco*

Martinet noir *Apus apus*

Premiers Martinets observés à Ecluzelles le 20 avril et derniers à Berchères-les-Pierres le 30 août

Martin-pêcheur *Alcedo atthis*

Mentionné uniquement dans les vallées de l'Eure et du Loir en période de reproduction.

Huppe fasciée *Upupa epops*

Un couple a niché dans un verger à Charpont (information recueillie par E. LEMEE). Une seule autre mention : 1 ind. en vol à Argenville, le 18 avril.



MARTIN-PÊCHEUR



Pic noir *Dryocopus martius*

Noté uniquement en forêt de Montécôt en période de nidification. En octobre, 1 ind. à Cormainville, le 11 (T. CENSE) et 1 autre à Tardais, le 25 (A. HOUSSIER).

Pic cendré *Picus canus*

Un mâle à Villemeux le 1er février (E. LEMEE) et 2 chanteurs notés au printemps, l'un en forêt de Senonches (G. MOREAU), l'autre en forêt de Montécôt (M. DOUBLET).

Pic vert *Picus viridis*

Pic épeiche *Dendrocopos major*

Pic mar *Dendrocopos medius*  
Noté uniquement en forêt de Montécôt.

Pic épeichette *Dendrocopos minor*

Torcol fourmilier *Jynx torquilla*  
Observé à Ecluzelles (1 ind.) les 23 et 28 avril (E. LEMEE).

Alouette calandrelle *Calandrella cinerea*

En dehors du site de nidification de Neuvy-en-Beauce un oiseau a chanté régulièrement à Péronville (Nat. Orléanaise 1987). Pas de contact à Viabon où l'espèce était présente l'an passé.

Alouette des champs *Alauda arvensis*

Cochevis huppé *Galerida cristata*

Hirondelle de cheminée *Hirundo rustica*

Premières observations, le 22 mars à Fontenay-sur-Eure et Ecluzelles, les dernières étant notées le 22 octobre à Fontenay-sur-Eure.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

Premières mentions le 22 mars, à Champrond-en-Gâtine et Fontenay-sur-Eure. Au moins 4 couples nicheurs dans un tas de matériaux d'une carrière de St-Luperce, ce monticule

sera ensuite détruit. A Méréglise, au moins 12 couples ont niché dans le talus d'une gravière. Fin août (le 29), un millier d'Hirondelles de rivage étaient perchées sur des fils à proximité d'un dortoir à Vallières. Dernière observation, le 9 octobre, à Fontenay-sur-Eure.

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica*

Comme pour les 2 autres espèces d'Hirondelles, première mention (précoce) à Fontenay-sur-Eure le 22 mars. Dernière observation le 18 octobre, à Berchères-les-Pierres.

Pipit des arbres *Anthus trivialis*

Premier chanteur le 4 avril, à Frétigny, et dernière mention le 20 septembre, à Alluyes.

Pipit farlouse *Anthus pratensis*

Nicheur à St-Georges-sur-Eure, Saumeray et St-Victor-de-Buthon. Petites bandes (maximum 45 ind.) en octobre.

Pipit spioncelle *Anthus spinoletta*

Une seule mention : 1 ind. à St-Avit-les-Guespières le 21 mars.

Bergeronnette grise *Motacilla alba*

Quatre mentions pour les 2 premiers mois de l'année (maximum 7 ind., à Toury, le 10 janvier). Notée communément à partir de la 2ème décade de mars. De petites bandes seront vues en septembre et octobre (maximum 35 ind. à Conie-Molitard, le 16 octobre).

Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea*

En période de reproduction, mentionnée uniquement dans la vallée de l'Eure. Peu observée sur l'ensemble de la période (maximum en mars et octobre).

Bergeronnette printanière *Motacilla flava*

Première observation le 7 avril, à Fontenay-sur-Eure. Nicheuse dans les vallées de l'Eure, du Loir et de la Conie. Le passage post-nuptial sera noté à partir de fin



BERGERONNETTE GRISE



FAUVETTE À TÊTE NOIRE

août. Dernières mentions le 3 octobre. La sous-espèce *M. f. flavissima* a été vue uniquement à St-Georges-sur-Eure.

Pie-grièche grise *Lanius excubitor*

Observée seulement sur 3 sites, pendant le 1er trimestre, cette Pie-grièche n'a été mentionnée qu'en un seul endroit en période de nidification (Andrevilliers). Notée lors de la 2ème quinzaine d'octobre sur 2 sites où elle était présente pendant le 1er trimestre.

Accenteur mouchet *Prunella modularis*

Locustelle tachetée *Locustella naevia*

Chanteurs mentionnés entre le 25 avril et le 20 juillet.

Locustelle lusciniotide *Locustella luscinioides*

Notée le 19 avril en vallée de la Conie (Nat. Orléanais 1987)

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus*

Premier contact : 1 chanteur timide le 18 avril à Argenvilliers, chants suivis à partir du 1er mai. A noter un passage en zone urbaine début juin : un chanteur dans le jardin d'un ornithologue (J. C. RUFFLET) les 2 et 3 juin à Chartres (ZUP de la Madeleine) et, toujours le 3 juin dans le même quartier, un chanteur dans un autre jardin et un chanteur dans les buissons bordant la petite pièce d'eau d'un bâtiment administratif (M. DOUBLET). Dernières mentions les 19 et 20 septembre.

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus*

Entendue à partir de la mi-mai, à Courbehaye, dans la vallée de la Conie. Pas de contacts après le mois de juin.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus*

Première mention le 8 avril, à Varize. Pas de contacts après le mois de juillet.

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti*

Aucun contact avec cette espèce dans la vallée de la Conie pendant la période considérée. La Bouscarle a disparu à la suite des derniers hivers rigoureux (84-85, 85-86, 86-87). Dans le département, elle n'a été notée que dans la vallée de l'Eure, à Landelles, en période de reproduction (2 chanteurs) et, à Villiers-le-Morhier, 1 chanteur le 17 octobre (A. HOUSIER).

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta*

Premier chanteur à Frétigny, le 25 avril, et dernière mention le 13 septembre à Toury (3 ind.).

Fauvette grisette *Sylvia communis*

Première observation le 17 avril à Villeneuve et premiers chanteurs le 20 avril. Dernière mention le 20 septembre à St-Avit-les-Guespières.

Fauvette babillarde *Sylvia curruca*

Mentionnée uniquement en mai au passage (d'abord le 1er au Thieulin). Présente à St-Avit-les-Guespières en période de reproduction.

Fauvette des jardins *Sylvia borin*

Première observation, le 8 avril, à Ecluzelles. Premiers chants le 20 avril. Dernière mention le 20 septembre à St-Avit-les-Guespières.

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla*

Première observation le 15 mars, à Landelles, et premiers chanteurs notés le 5 avril à Boizard, commune de Pontgouin.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*

Premier chanteur, le 30 mars, à Nonvilliers-Grandhous et dernière mention le 12 septembre à Viabon.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita*

Une seule mention pour les 2 premiers mois de l'année, le 3 janvier à Chartres (1 ind.). Contacté régulièrement à partir du 10 mars.

